



STINE FÜRST
Speciallæge i gynækologi og obstetrik

Kegleoperation

Du har fået konstateret celleforandringer på livmoderhalsen og skal have foretaget en kegleoperation.

Det er et mindre indgreb hvor celleforandringerne på livmoderhalsen skæres væk.

Indgrebet varer ca. 15 minutter og foregår i lokalbedøvelse.

Ved ankomsten til klinikken får du endvidere smertestillende medicin.

Med en varm slyng udskæres en lille kegle/skive af livmoderhalsen.

Blødningen efter operationen vil være begrænset og ophører i løbet af en uges tid, men når sårskorpen løsner sig nogle dage senere, kan der igen komme en blødning. Denne blødning varer oftest et par dage.

Kun meget sjældent vil blødningen være så kraftig, at du skal undersøges.

Får du blødning af stærkere styrke end almindelig menstruation eller får du feber, ringer du til os på telefon 56 66 34 33.

Udskrivelse og efterforløb:

Kort tid efter indgrebet vil du være klar til at tage hjem og du medgives en tid til kontrol efter 3 mdr.

Sygemeldingen varierer fra 0-7 dage afhængig af indgreb og job.

De første 2 uger efter indgrebet bør du undgå samleje og fysisk krævende aktiviteter som sport m.v.

Du bør i samme periode ikke anvende tamponer, bade i havet, i svømmehal eller gå i karbad.

Der kan være blødning/udflåd i 2-3 uger efter indgrebet.

Såret vil være fuldstændig helet efter 4 uger, og livmoderhalsen vil da have næsten normalt udseende.

Indgrebet har som hovedregel ingen indflydelse på muligheden for at blive gravid.